

NHR Rapportage

PCI-ICD centra

2022

Inhoudsopgave


1. ICD (Defibrillator)	5
30-daagse mortaliteit	6
90-daagse mortaliteit	7
Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname	8
Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname	9
Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	10
Compleetheid verplichte variabelen	11
Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma	12
2. Pacemaker	13
30-daagse mortaliteit	14
90-daagse mortaliteit	15
Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname	16
Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname	17
Cardiale tamponade binnen 30 dagen	18
Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	19
Compleetheid verplichte variabelen 1	20
Compleetheid verplichte variabelen 2	21
Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma	22
3. PCI Dottercentra	23
30-daagse mortaliteit - STEMI	24
30-daagse mortaliteit - non-STEMI	25
30-daagse mortaliteit - dottercentra	26
1-jaars mortaliteit - STEMI	27
1-jaars mortaliteit - non-STEMI	28
1-jaars mortaliteit - dottercentra	29
Langetermijnoverleving - dottercentra	30
Kwaliteit van leven - dottercentra	31
Urgente CABG - dottercentra	32
Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - dottercentra	33
Optreden van TVR binnen 1 jaar - dottercentra	34
Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - dottercentra	35
Optreden van TLR binnen 1 jaar - dottercentra	36
Compleetheid verplichte variabelen	37
Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra	38

De gepresenteerde cijfers en figuren hebben als primaire doel om professionals inzicht te geven in patiëntrelevante resultaten van de zorg, waardoor zij aanknopingspunten kunnen zoeken en vinden voor verdere verbetering. Meer informatie t.a.v. de gehanteerde statistische methode onderliggend aan de gepresenteerde cijfers en figuren, en de interpretatie hiervan staat beschreven in de [analysemethodiek van de NHR. De leeswijzer](#) geeft een toelichting op welke wijze de verschillende cijfers en figuren gelezen kunnen worden.

1. ICD (Defibrillator)

30-daagse mortaliteit

Pacemaker/ICD - ICD - 30-daagse mortaliteit




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, ICD-preventie, leeftijd, nierinsufficiëntie, pacemakerfunctie, patroon AF en interventiejaar.

90-daagse mortaliteit

Pacemaker/ICD - ICD - 90-daagse mortaliteit




Geïnccludeerde interventiejaar = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, ICD-preventie, leeftijd, nierinsufficiëntie, pacemakerfunctie, patroon AF en interventiejaar.

Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname

Pacemaker/ICD - ICD - bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, ICD-preventie, leeftijd, nierinsufficiëntie, pacemakerfunctie, patroon AF en interventiejaar.

Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname

Pacemaker/ICD - ICD - pneumothorax tijdens ziekenhuisopname




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicocorrigeerd voor: BMI, geslacht, ICD-preventie, leeftijd, nierinsufficiëntie, pacemakerfunctie, patroon AF en interventiejaar.

Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen

Pacemaker/ICD - ICD - complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen




Geïnccludeerde interventiejaar = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, ICD-preventie, leeftijd, nierinsufficiëntie, pacemakerfunctie, patroon AF en interventiejaar.

Compleetheid verplichte variabelen

Pacemaker/ICD - ICD - compleetheid kwartaal 4 2020 t/m kwartaal 3 2021 per centrum



* Voor 2021 nog (bijna) geen interventies aangeleverd met als behandelgroep ICD.

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

Pacemaker/ICD - ICD - uitkomstvariabelen, patiëntkarakteristieken, interventievariabelen en compleetheid aangeleverde data



	AMC	St. Antonius	Catharina	Flevo	Franciscus	Haga	HMC	Isala	MCL	MST	MUMC	OLVG	Rijnstate	UINCG	Totaal
Interventiejaars	'18-'21	'18-'21	'19-'21	2021		'18-'21	'18-'21	'18-'21	'18-'21	'19-'21	'19-'21	2021	'19-'21	'19-'21	
Aantal patiënten	1002	1462	999	92		901	492	1763	777	791	1213	143	341	551	10527
Uitkomstvariabelen															
GEZONDHEIDSTATUS BEREIKT / BEHOUDEN															
30-daagse mortaliteit	0,6%	0,3%	0,3%			0,7%	0,0%	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%	0,3%
90-daagse mortaliteit	1,2%	1,2%	0,7%			1,8%	0,6%	1,0%	1,0%	0,6%	1,2%	0,7%		0,9%	1,0%
MATE VAN HERSTEL / GEZONDHEID															
Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname	0,1%	0,2%	0,9%	0,0%		0,3%	0,0%	1,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	1,8%	0,0%	0,4%
Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname	0,5%	0,3%	0,2%	0,0%		0,3%	0,0%	1,4%	0,5%	0,1%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,3%
Cardiale tamponade binnen 30 dagen *	0,0%	0,1%	0,2%			0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Bloedingscomplicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,1%	0,2%				0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%		0,0%	0,3%	0,0%	0,1%
Draad-defect waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,0%	0,5%				0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%		0,0%	0,3%	0,4%	0,2%
Draad-dislocatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,0%	1,1%				0,3%	1,2%	0,7%	2,0%	1,8%		0,7%	1,5%	0,5%	1,0%
Dissectie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Infectie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,0%	0,3%				0,8%	0,4%	0,5%	0,0%	0,3%		0,0%	1,2%	0,2%	0,4%
Perforatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,2%	0,5%				0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,1%		0,7%	0,0%	0,0%	0,3%
ICD-defect waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,3%	0,1%				0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
ICD-dislocatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen	0,0%	0,2%				0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reïnterventies binnen 90 dagen	0,6%	2,9%	2,2%			1,7%	2,0%	2,1%	2,6%	2,3%		0,7%	3,3%	1,1%	2,0%
Patiëntkarakteristieken															
AV-block			4,4%	16,0%							32,3%		19,4%	23,8%	19,2%
BMI (≥ 25 kg/m ²)	58,3%	66,4%	66,7%	69,6%		69,5%	69,5%	69,7%	65,3%	71,3%	68,1%	75,4%	70,4%	64,0%	68,0%
Diabetes mellitus			21,7%	19,6%						19,6%	20,9%	32,9%	18,7%	15,3%	21,2%
Geslacht (man)	71,8%	76,1%	74,4%	81,5%		81,9%	78,0%	73,7%	77,7%	78,6%	77,2%	81,1%	77,4%	72,2%	77,1%
Hartfalen			28,1%	72,0%		89,0%	71,1%		71,3%		80,5%		61,0%	67,7%	67,6%
ICD met PM-functie	24,1%	85,6%		27,2%		79,6%		42,8%	43,1%	28,3%	45,1%	0,0%	65,0%	45,0%	44,2%
ICD-preventie (secundair)	52,0%	37,9%	48,2%	59,8%		40,3%	27,3%	36,5%	35,7%	37,2%	38,4%	33,6%	48,4%	33,2%	40,6%
Leeftijd (≥ 80 jaar)	7,0%	11,5%	9,5%	12,0%		11,2%	11,0%	10,8%	10,6%	8,0%	12,6%	9,8%	10,9%	4,2%	9,9%
Linkerventrikelfunctie (< 30%)			32,6%	34,8%		35,8%	33,3%		44,0%		31,8%	34,0%		39,9%	35,8%
Nierinsufficiëntie (eGFR < 60)			37,7%	29,7%		35,0%	37,6%	44,7%	35,3%	33,6%	43,9%	40,8%		38,5%	37,7%
Sinusnode disfunctie			2,9%	16,0%							21,9%		6,0%	21,4%	13,6%
Patroon AF (langdurig persisterend)	53,9%	7,4%	6,0%	3,3%		7,9%	9,6%	14,2%	0,9%	6,5%	11,5%	1,4%	12,2%	13,6%	11,4%

* In verband met de lage incidentie van de uitkomst Cardiale tamponade binnen 30 dagen, is geen figuur voor deze uitkomst gepubliceerd.


Legenda

gegevens niet aangeleverd niet voldoende gegevens beschikbaar gegevens compleet

2. Pacemaker

30-daagse mortaliteit

Pacemaker/ICD - Pacemaker - 30-daagse mortaliteit




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.

90-daagse mortaliteit

Pacemaker/ICD - Pacemaker - 90-daagse mortaliteit




C-statistic = 0,74 (redelijk); geïncludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.

Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname

Pacemaker/ICD - Pacemaker - bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.

Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname

Pacemaker/ICD - Pacemaker - pneumothorax tijdens ziekenhuisopname




Geïnccludeerde interventiejaar = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.

Cardiale tamponade binnen 30 dagen

Pacemaker/ICD - Pacemaker - cardiale tamponade binnen 30 dagen




Geïnccludeerde interventiejaren = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.

Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen

Pacemaker/ICD - Pacemaker - complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen




C-statistic = 0,59 (matig); geïnccludeerde interventiejaar = 2018-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: BMI, geslacht, leeftijd, nierinsufficiëntie, patroon AF en interventiejaar.


Compleetheid verplichte variabelen 1

Pacemaker/ICD - Pacemaker - compleetheid kwartaal 4 2020 t/m kwartaal 3 2021 per centrum



Compleetheid verplichte variabelen 2

Pacemaker/ICD - Pacemaker - compleetheid kwartaal 4 2020 t/m kwartaal 3 2021 per centrum




* Voor 2021 nog (bijna) geen interventies aangeleverd met als behandelgroep pacemaker.

3. PCI Dottercentra

30-daagse mortaliteit - STEMI

Coronairlijden - PCI - 30-daagse mortaliteit - STEMI



Legenda


95% BI ondergrens	A AMC	E Erasmus MC	I MCL	M Radboudumc	c ETZ	g Meander	k Treant
99% BI ondergrens	B Amphia	F Haga	J MST	N UMCG	d HMC	h Noordwest	m VieCuri
95% BI bovengrens	C St. Antonius	G Isala	K MUMC	O UMCU	e JBZ	i Rijnstate	n ZorgSaam
99% BI bovengrens	D Catharina	H LUMC	L OLVG	P VUMC	f Maasstad	j Tergooi	o Zuyderland

C-statistic = 0,88 (goed); geïnccludeerde interventiejaar = 2017-Q3 2021.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

30-daagse mortaliteit - non-STEMI

Coronairlijden - PCI - 30-daagse mortaliteit - non-STEMI



Legenda


95% BI ondergrens	A AMC	E Erasmus MC	I MCL	M Radboudumc	c ETZ	g Meander	k Treant
99% BI ondergrens	B Amphia	F Haga	J MST	N UMCG	d HMC	h Noordwest	m VieCuri
95% BI bovengrens	C St. Antonius	G Isala	K MUMC	O UMCU	e JBZ	i Rijnstate	n ZorgSaam
99% BI bovengrens	D Catharina	H LUMC	L OLVG	P VUMC	f Maasstad	j Tergooi	o Zuyderland

C-statistic = 0,84 (goed); geïnccludeerde interventiejaar = 2017-Q3 2021.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

30-daagse mortaliteit - dottercentra

Coronairlijden - PCI - 30-daagse mortaliteit




C-statistic = 0,89 (goed); geïnccludeerde interventiejaren = 2017-Q3 2021.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

1-jaars mortaliteit - STEMI

Coronairlijden - PCI - 1-jaars mortaliteit - STEMI



Legenda


95% BI ondergrens	A AMC	E Erasmus MC	I MCL	M Radboudumc	c ETZ	g Meander	k Treant
99% BI ondergrens	B Amphia	F Haga	J MST	N UMCG	d HMC	h Noordwest	m VieCuri
95% BI bovengrens	C St. Antonius	G Isala	K MUMC	O UMCU	e JBZ	i Rijnstate	n ZorgSaam
99% BI bovengrens	D Catharina	H LUMC	L OLVG	P VUMC	f Maasstad	j Tergooi	o Zuyderland

C-statistic = 0,84 (goed); geïncordeerde interventiejaar = 2017-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

1-jaars mortaliteit - non-STEMI

Coronairlijden - PCI - 1-jaars mortaliteit - non-STEMI



Legenda


95% BI ondergrens	A AMC	E Erasmus MC	I MCL	M Radboudumc	c ETZ	g Meander	k Treant
99% BI ondergrens	B Amphia	F Haga	J MST	N UMCG	d HMC	h Noordwest	m VieCuri
95% BI bovengrens	C St. Antonius	G Isala	K MUMC	O UMCU	e JBZ	i Rijnstate	n ZorgSaam
99% BI bovengrens	D Catharina	H LUMC	L OLVG	P VUMC	f Maasstad	j Tergooi	o Zuyderland

C-statistic = 0,80 (goed); geïncordeerde interventiejaar = 2017-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

1-jaars mortaliteit - dottercentra

Coronairlijden - PCI - 1 jaars mortaliteit



Legenda


95% BI ondergrens	c ETZ	f Maasstad	i Rijnstate	m VieCuri
99% BI ondergrens	d HMC	g Meander	j Tergooi	n ZorgSaam
95% BI bovengrens	e JBZ	h Noordwest	k Treant	o Zuyderland
99% BI bovengrens				

C-statistic = 0,82 (goed); geïnccludeerde interventie jaren = 2017-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Langetermijnoverleving - dottercentra

Coronairlijden - PCI - langetermijnoverleving




Risicogecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Centrum




Kwaliteit van leven - dottercentra

Coronairlijden - PCI - kwaliteit van leven



Urgente CABG - dottercentra

Coronairlijden - PCI - urgente CABG




Geïnccludeerde interventiejaar = 2017-Q3 2021.

Risicogecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - dottercentra

Coronairlijden - PCI - optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen




C-statistic = 0,63 (matig); geïnccludeerde interventiejaren = 2017-Q3 2021.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Geïnccludeerde jaren Maasstad 2018-Q3 2021, Treant 2018-Q3 2021, VieCuri Q4 2019-Q3 2021.

Optreden van TVR binnen 1 jaar - dottercentra

Coronairlijden - PCI - optreden van TVR binnen 1 jaar




C-statistic = 0,66 (matig); geïnccludeerde interventie jaren = 2017-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardiinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Geïnccludeerde jaren HMC Q4 2018-Q3 2020, Maasstad 2018-Q3 2020, VieCuri Q4 2018-Q3 2020.

Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - dottercentra

Coronairlijden - PCI - optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar




C-statistic = 0,65 (matig); geïnccludeerde interventiejaren = 2019-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Optreden van TLR binnen 1 jaar - dottercentra

Coronairlijden - PCI - optreden van TLR binnen 1 jaar




C-statistic = 0,64 (matig); geïnccludeerde interventiejaren = 2019-Q3 2020.

Risico-gecorrigeerd voor: cardiogene shock, chronische totale occlusie, diabetes mellitus, eerdere CABG, eerder myocardinfarct, geslacht, indicatie PCI, leeftijd, meervatslijden, nierinsufficiëntie, out of hospital cardiac arrest en interventiejaar.

Geïnccludeerde jaren Maasstad Q1 2020-Q3 2020.

Compleetheid verplichte variabelen

Coronairlijden - PCI - compleetheid kwartaal 4 2020 t/m kwartaal 3 2021 per centrum



Uitkomstvariabelen met follow-up – compleetheid TVR en staged procedure berekend over kwartaal 4 2019 t/m kwartaal 3 2020

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra

Coronairlijden - PCI - uitkomstvariabelen, patiëntkarakteristieken, interventievariabelen en compleetheid aangeleverde data



	ETZ	HMC	JBZ	Maasstad	Meander	Noordwest	Rijnstate	Tergooi	Treant	VieCuri	ZorgSaam	Zuyderland	Totaal
Interventiejaar	'17-'21	'18-'21	'17-'21	'17-'21	'17-'21	'17-'21	'19-'21	'17-'21	'17-'21	'17-'21	'17-'21	'17-'21	
Aantal patiënten	3633	3542	4855	6681	4144	5811	3133	3863	3724	4902	3337	4887	52512
Uitkomstvariabelen													
GEZONDHEIDSTATUS BEREIKT / BEHOUDEN													
30-daagse mortaliteit	2,7%	2,8%	2,5%	2,3%	2,9%	2,2%	3,0%	2,6%	2,1%	2,9%	2,4%	2,9%	2,6%
1-jaars mortaliteit	5,1%	7,0%	5,0%	4,2%	5,7%	4,9%	5,2%	5,2%	4,2%	7,4%	5,8%	6,7%	5,5%
Langtermijnoverleving													
MATE VAN HERSTEL / GEZONDHEID													
Kwaliteit van leven													
Urgente CABG	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%
Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen	0,8%		0,8%	0,8%	0,5%	1,2%	1,1%	0,6%	0,3%	0,4%	0,2%	0,7%	0,7%
Optreden van TVR binnen 1 jaar	6,6%	8,1%	8,6%	2,4%	7,0%	8,4%	6,0%	6,9%	8,5%	5,4%	5,9%	4,8%	6,6%
Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar*	3,5%	4,8%	3,9%	1,9%	2,5%	2,9%	2,0%	3,5%	3,0%	2,6%	4,4%	3,0%	3,2%
Optreden van TLR binnen 1 jaar*	2,1%	3,8%	3,2%	0,7%	2,7%	2,0%	2,2%	2,1%	1,3%		2,3%	2,3%	2,2%
Patiëntkarakteristieken													
Cardiogene shock	2,5%	1,9%	2,0%	2,1%	3,8%	1,8%	4,1%	3,9%	2,6%	3,7%	3,8%	2,1%	2,9%
Chronische totale occlusie	3,0%	3,3%	4,9%	3,6%	5,2%	5,3%	1,4%	4,4%	3,4%	2,8%	2,3%	5,8%	3,8%
Diabetes mellitus	23,4%	28,7%	19,6%	23,4%	20,8%	22,0%	19,0%	20,3%	23,7%	19,9%	19,8%	22,7%	21,9%
Eerdere CABG	10,8%	10,9%	9,6%	5,5%	5,9%	6,0%	4,5%	5,1%	9,0%	9,5%	8,9%	11,4%	8,1%
Eerder myocardinfarct	21,7%	22,6%	26,1%	15,0%	18,6%	22,8%	18,8%	22,3%	20,7%	23,1%	17,5%	24,7%	21,1%
Geslacht (man)	74,0%	70,1%	71,0%	72,3%	72,0%	73,0%	72,1%	73,8%	69,5%	71,7%	70,8%	70,5%	71,7%
Indicatie PCI (STEMI)	27,6%	24,8%	30,9%	25,8%	32,2%	27,9%	47,9%	36,1%	23,3%	31,7%	28,3%	26,1%	30,2%
Leeftijd (≥ 80 jaar)	11,6%	15,3%	13,1%	11,0%	13,9%	15,7%	12,9%	13,3%	12,8%	16,7%	17,4%	15,6%	14,1%
Linkerventrikelfunctie (< 30%)						7,4%							7,4%
Meervatslijden	53,6%	63,5%	52,4%	43,0%	44,9%	47,3%	40,6%	48,5%	55,2%	62,9%	55,9%		51,6%
Nierinsufficiëntie (eGFR < 60)	23,0%	24,7%	18,2%	21,1%	21,9%	22,9%	14,0%	19,2%	20,8%		22,4%	28,5%	21,5%
Out of hospital cardiac arrest	2,8%	3,8%	3,4%	2,5%	3,7%	2,8%	4,5%	3,2%	2,4%	4,9%	2,9%	2,6%	3,3%
Interventievariabelen													
Verwezen patiënten													
Hartteam bespreking													
Toegangsweg													

*Optreden van TVR (excl. staged procedures) en TLR vanaf 2019 bekend

Legenda

gegevens niet aangeleverd

niet voldoende gegevens beschikbaar

gegevens compleet